XAROPE GUACO MELPOEJO

Nomenclatura botânica oficial: Mikania glomerata

Nomenclatura popular: Guaco. Família: Compositae (Asteraceae). Parte da planta utilizada: Folhas.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

APRESENTAÇÕES

Xarope de Extrato Fluido de Mikania glomerata Sprengel (0,1 mL/mL).

Frasco PET âmbar contendo 60 mL ou 100 mL ou 140 mL de medicamento, acompanhado de 1 (um) copo dosador.

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO: cada mL de xarope contém:

Extrato Fluido de Mikania glomerata Sprengel.......0,1 mL (padronizado em 0,54 a 0,66 mg de cumarina/mL).

Excipientes (água purificada, benzoato de sódio, Açúcar, álcool etílico*, metilparabeno, aroma de poejo, mel de abelha).....q.s.p. 1 mL * 0,005 mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? XAROPE GUACO MELPOEJO é indicado broncodilatador e expectorante.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A ação broncodilatadora e expectorante do XAROPE GUACO MELPOEJO são atribuídas ao seu principal constituinte químico, a cumarina, que provoca relaxamento da musculatura lisa respiratória e a diminuição da secreção brônquica.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

XAROPE GUACO MELPOEJO é contraindicado para pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Portadores de hemofilia não devem usar este medicamento

Este medicamento é contraindicado para menores de 2

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE **MEDICAMENTO?**

Advertências e precauções

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Em pacientes com problemas hepáticos o uso prolongado de XAROPE GUACO MELPOEJO pode provocar toxicidade. Recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo-se afastar a hipótese de tuberculose e câncer.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgiãodentista. Na ocorrência de gravidez ou se estiver amamentando, consulte o médico antes de fazer o uso deste medicamento.

Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

XAROPE GUACO MELPOEJO não deve ser empregado simultaneamente com anticoagulantes (ex.: Heparina Sódica, Varfarina Sódica, Enoxaparina Sódica) e produtos contendo Tabebuia avellanedae (Ipê-roxo).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Assim como todos os medicamentos, informe ao seu profissional da saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicas que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre medicamentos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO **GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

XAROPE GUACO MELPOEJO deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido de calor e umidade e ao abrigo da luz. Manter o frasco bem fechado e na posição vertical.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Após aberto, válido por 2 meses.

XAROPE GUACO MELPOEJO é apresentado na forma líquida, de cor amarronzada e sabor adocicado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso

ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Usar este medicamento somente por VIA ORAL. Utilizar o copo dosador para medir o volume de xarope a ser ingerido. Agite o frasco antes de usar.

Adultos: Ingerir 5 mL do xarope, 4 vezes ao dia, em intervalos de 6 em 6 horas.

Crianças de 7 a 12 anos: Ingerir 2,5 mL do xarope, 6 vezes ao dia, em intervalos de 4 em 4 horas.

Crianças de 3 a 6 anos: Ingerir 2,5 mL do xarope, 4 vezes ao dia, em intervalos de 6 em 6 hora.

Nos casos de doenças respiratórias agudas, recomenda-se o uso do medicamento por 7 (sete) dias consecutivos. Em casos crônicos, usar por 2 (duas) semanas.

Cada mL de XAROPE GUACO MELPOEJO contém de 0,054 a 0,066 mg de cumarina.

Limite máximo diário de administração deste medicamento: Adultos: 20 mL/dia.

Crianças de 7 a 12 anos: 15 mL/dia. Crianças de 3 a 6 anos: 10 mL/dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO **PODE CAUSAR?**

Nas doses terapêuticas descritas na posologia não foram observados efeitos adversos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA **DESTE MEDICAMENTO?**

A ingestão de altas doses de XAROPE GUACO MELPOEJO pode provocar vômito e diarreia. Nesta situação, suspender o uso do medicamento e procurar imediatamente orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Reg. ANVISA/MS Nº: 1.0534.0005.003-6

Farm. Resp.: Carmem da Rocha Zancanella - CRF - MG nº 7475

Melpoejo®

Laboratório Melpoejo Ltda. Rua Inácio Gama, 723/737, Bairro de Lourdes CEP: 36070-420 - Juiz de Fora - MG CNPJ: 21.549.522/0001-17 Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: (032) 3235- 1505 sac@melpoejo.com.br www.melpoejo.com.br

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

